

REPERAGE DES SITUATIONS A RISQUE DE DECOMPENSATION AIGUË

| SYMPTOMES | RECHERCHE DES SIGNES ASSOCIES | RESULTAT | POURQUOI |
|--|---|---|--|
| AFFECTION INTERCURRENTTE CHEZ UN RESIDENT DIABETIQUE | - Surveillance plus rapprochée de la glycémie capillaire | Appeler le médecin si déséquilibre | Risque de décompensation de la glycémie capillaire |
| PRISE DE POIDS D'AU MOINS 3 KG DANS LE MOIS | - RECONTROLE DU POIDS TOUTES LES 48H - RECHERCHE DE SIGNES DE GENE RESPIRATOIRE JOUR ET NUIT - RECHERCHE D'CEDEME | APPELER LE MEDECIN SI SIGNE ASSOCIES OU MAJORATION DE LA PRISE DE POIDS | RISQUE DE DECOMPENSATION D'INSUFFISANCE CARDIAQUE |
| PERTE DE POIDS DE 5% DANS LE MOIS | - Surveillance des apports hydriques et alimentaires - Recherche de signes digestifs - Vérification de l'état buccal | Appeler le médecin si signes associés ou traitement diurétique | Risque de déshydratation |
| TOUX INHABITUELLE | - Recherche de fièvre, de prise de poids, de modification du comportement, de majoration de l'encombrement bronchique éventuel - Mesure de la fréquence respiratoire et saturation en oxygène | Appeler le médecin si signes associés ou toux persistante | Risque de décompensation respiratoire |
| COMPORTEMENT INHABITUEL Tous les comportements répertoriés dans le NPI* sont à prendre en compte (ex : agitation, agressivité, apathie...) | - Prise des constantes et réalisation de la bandelette urinaire, retard de selles, - Recherche d'une douleur, d'un globe vésical, de signes de déshydratation, de signes respiratoires, de troubles de la glycémie, d'antécédents de chute récente, changement de traitement récent - Enregistrement des fluctuations du comportement sur les 24h | Appeler le médecin si signes associés ou persistance du comportement inhabituel | Signes précurseurs de toute affection aiguë |

* Neuro-Psychiatric Inventory